



BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ĐỢT CẤP BPTNMT

BPTNMT: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tiền sử đợt cấp BPTNMT là yếu tố dự đoán nguy cơ quan trọng nhất

Câu 1: Sử dụng thuốc cắt cơn dạng xịt thường xuyên cho thấy triệu chứng của ông/bà đang nặng lên.

Câu 2-4: Nếu trả lời ≥ 1 cho bất cứ câu hỏi nào, điều đó cho thấy ông/bà đã trải qua đợt cấp BPTNMT trong năm vừa qua. Và ông/bà phải trao đổi với bác sĩ về vấn đề này.

Hãy sử dụng bộ câu hỏi này để trao đổi với bác sĩ trong lần thăm khám BPTNMT tiếp theo.

1 Để kiểm soát triệu chứng, tần suất sử dụng thuốc cắt cơn (dạng xịt hít hoặc khí dung) mỗi tuần?

☐

Không bao giờ/
hiếm khi

☐

1 hoặc 2 lần/
tuần

☐

Hầu hết
các ngày

☐

Hàng ngày

2 Trong năm vừa qua, ông/bà đã phải sử dụng bao nhiêu đợt kháng sinh để điều trị BPTNMT?

☐

Không bao giờ/
không chắc

☐

1

☐

2

☐

3+

3 Trong năm vừa qua, ông/bà đã phải sử dụng bao nhiêu đợt corticoid (như prednisolone..) để điều trị BPTNMT?

☐

Không bao giờ/
không chắc

☐

1

☐

2

☐

3+

4 Trong năm vừa qua, ông/bà đã phải nhập viện hoặc nhập cấp cứu bao nhiêu lần vì BPTNMT?

☐

Không bao giờ/
không chắc

☐

1

☐

2

☐

3+